


# novo nordisk guide du diabète



Alex Silverberg Type 1 Suède

Prix CHF 5.-, incl. TVA

Novo Nordisk Pharma SA  
CH-8050 Zürich  
[www.novonordisk.ch](http://www.novonordisk.ch)



changing diabetes®



## table des matières

### guide du diabète

<b>Préface</b>	<b>4</b>
<b>Le diabète - généralités</b>	<b>5</b>
Qu'est-ce que le diabète ?	5
Le diabète de type 1	5
Le diabète de type 2	5
Le diabète gestationnel	5
Digestion et métabolisme chez le sujet non diabétique	6
Le métabolisme glucidique	7
Légende métabolisme glucidique	8
La glycémie en chiffres	9
Qu'est-ce que l'insuline et comment agit-elle	9
Le métabolisme glucidique chez le diabétique	10
Symptômes	10
Le diabète de type 1	10
Le diabète de type 2	10
<b>L'alimentation</b>	<b>11</b>
Les nutriments	11
Pyramide alimentaire	11
Les aliments et la glycémie	11
Guide alimentaire pour diabétiques	11
<b>Le traitement du diabète sucré</b>	<b>12</b>
Les différentes formes de traitement	12
Le traitement du diabète de type 1	12
Le traitement du diabète de type 2	12
Les traitements médicamenteux	13
Agonistes du récepteur du GLP-1	13
Analogues de l'insuline	13
Metformine	13
Inhibiteurs de la DPP-4	13
Insulines à courte durée d'action	14
Insulines à longue durée d'action	15
Insulines mixtes	16
Inhibiteurs du SGLT2	17
Sulfonylurées	17
Technique d'injection	18

## table des matières

### guide du diabète

<b>Le réglage de la glycémie</b>	<b>19</b>
Quelles sont les valeurs-cibles à atteindre ?	19
Correction de la glycémie, déviation de la glycémie	19
Hypoglycémie (taux de sucre trop bas)	19
Hyperglycémie (taux de sucre trop élevé)	21
Acidocétose diabétique/cétonurie	22
<b>Les conséquences tardives du diabète (complications tardives)</b>	<b>23</b>
Que sont les conséquences tardives du diabète ?	23
Atteintes tissulaires et organiques	23
Le pied diabétique	23
<b>Prendre son diabète en main</b>	<b>24</b>
Prise en charge de son diabète	24
Contrôles médicaux réguliers	24
HbA <sub>1c</sub>	24
La mesure de la glycémie	25
Le journal du diabète	26
Consultation médicale	26
Contrôle quotidien des pieds	26
<b>Situations particulières</b>	<b>27</b>
Diabète et sport	27
Diabète et activité physique	28
Diabète et conduite	29
Diabète et maladie	29
Diabète et travail	30
Diabète et voyage	30
Diabète et vie sexuelle	31
Diabète et grossesse	32
Diabète et tension psychique	32
<b>La fabrication et le stockage de l'insuline</b>	<b>33</b>
Le stockage de l'insuline	34
<b>Glossaire</b>	<b>35-37</b>
World Diabetes Day /World Diabetes Foundation	38
Adresses utiles / Epilogue	39

## préface guide du diabète

Cameron Hubbard Type1 États-Unis

### Préface

#### Chères lectrices et chers lecteurs

Peut-être avez-vous vous-même le diabète ou connaissez-vous quelqu'un dans le cercle de vos connaissances ou amis qui est diabétique? Le diabète sucré touche tous les pays du monde. En Suisse, selon les estimations, env. 500'000 personnes vivent avec un diabète sucré. Viennent en plus les nombreuses personnes qui ne savent pas qu'elles ont le diabète. Un diabète sucré non soigné pouvant entraîner de nombreuses conséquences, la possibilité d'un diagnostic précoce est d'une énorme importance. Demandez à votre médecin comment fonctionne votre glycémie. Le nom « *diabetes mellitus* », utilisé par la classification internationale des maladies pour indiquer le diabète sucré, dérive du mot grec « Diabetes » (= débit) et du mot latin « mellitus » (sucré comme le miel). Cela veut dire que le sucre, au lieu d'être absorbé par les cellules est éliminé par l'urine. On connaissait déjà le diabète dans l'antiquité. Mais ce n'est qu'en 1921 que les Canadiens Banting et Best ont réussi à obtenir à partir de

tissu de pancréas de l'insuline, substance responsable de la régulation du sucre dans le corps, et à traiter un chien diabétique. En 1922, on a réussi pour la première fois à traiter une personne diabétique.

## le diabète - généralités le diabète de type 1, le diabète de type 2

Denise Troutman Type2 États-Unis

### Qu'est-ce que le diabète ?

Le diabétique souffre d'un trouble du métabolisme glucidique. Le sucre n'est pas assimilé correctement par l'organisme. La teneur en sucre du sang, la glycémie, augmente de manière exagérée. La cause en est un déficit absolu ou relatif d'insuline.

Cela signifie que :

- le pancréas ne produit pas ou trop peu d'insuline et/ou
- l'insuline endogène n'est pas assez efficace

#### Le diabète de type 1

Lorsque le pancréas ne produit pas d'insuline du tout, on parle de « diabète de type 1 ». Généralement, ce type de diabète apparaît subitement et souvent dès l'enfance ou l'adolescence. C'est pourquoi on l'appelait autrefois également « diabète juvénile ». L'apport en insuline doit se faire entièrement de l'extérieur et dans les plus brefs délais. Le diabète de type 1 apparaît lorsque le système immunitaire (système de défense) de l'organisme commence à détruire les cellules pancréatiques produisant de l'insuline. Cette défaillance du système immunitaire est également appelée « auto-immunité ».

#### Le diabète de type 2

Autrefois, on appelait également le diabète de type 2 « diabète de l'âge », car il apparaît souvent chez les personnes d'âge mûr et d'âge avancé. Cependant, de plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes en sont atteints. Dans le diabète de type 2, le pancréas produit encore de l'insuline au début de la maladie, mais en quantité insuffisante et au mauvais moment. Il arrive fréquemment que les cellules de l'organisme soient si résistantes vis-à-vis de l'insuline qu'elles ne parviennent plus à absorber suffisamment de sucre, de sorte que la glycémie augmente. Cette forme de diabète se développe tout d'abord lentement et n'est souvent pas reconnue durant de nombreuses années. Dans le diabète de type 2, on essaie tout d'abord de faire baisser la glycémie trop élevée par une alimentation ciblée, en cas d'excès pondéral particulièrement par une alimentation pauvre en graisse et de l'exercice physique. Le diabète de type 2 est toutefois une maladie chronique évolutive. C'est pourquoi, après un certain temps, le traitement médicamenteux doit parfois être introduit. Il est important que les patients se rendent à des contrôles médicaux réguliers.

Les facteurs de risque du diabète de type 2 sont, entre autres, des antécédents familiaux, le surpoids, le manque d'exercice physique et un diabète gestationnel antérieur.

#### Le diabète gestationnel

Une autre forme de diabète est le diabète gestationnel. Ce diabète apparaît durant la grossesse et disparaît souvent après l'accouchement.

Chez certaines femmes, un déséquilibre métabolique peut cependant persister après l'accouchement, ou un diabète de type 2 peut se développer après 5 à 10 ans. Il est donc capital de contrôler régulièrement la glycémie après un diabète gestationnel.



Anders Christensen Type2 Suède

### Digestion et métabolisme chez le sujet non diabétique

Notre organisme est constitué de milliards de cellules. Les cellules abritent de nombreuses réactions chimiques complexes. Ces processus forment ce qu'on appelle « le métabolisme ». L'organisme a besoin du métabolisme pour être capable d'exécuter le travail musculaire et renouveler ou multiplier les cellules (p. ex. de la peau, des cheveux). Pour fonctionner, le métabolisme nécessite un apport constant de nutriments. Ceux-ci sont apportés à l'organisme par l'alimentation. Les trois principaux nutriments qui composent l'alimentation sont :

1. Les hydrates de carbone
2. Les protéines
3. Les lipides



Les hydrates de carbone et les lipides agissent en premier lieu comme des nutriments qui fournissent l'énergie, alors que les protéines servent à la construction des cellules et remplissent de nombreuses autres fonctions.

Les aliments absorbés sont tout d'abord digérés, c'est-à-dire fragmentés, dans le tractus gastro-intestinal, car les cellules ne peuvent absorber que certaines substances simples. **Le système digestif** décompose les aliments de la manière suivante :

- les hydrates de carbone se décomposent en **glucose** (« sucre »)
- les **protéines** se décomposent en acides aminés
- les **lipides** se décomposent en acides gras


Dès lors, ces éléments peuvent traverser la paroi intestinale et atteindre ainsi le sang et les cellules.

#### Le métabolisme glucidique


Notre organisme a continuellement besoin d'énergie, même au repos. Lorsque cette énergie ne lui est pas fournie par l'alimentation, les cellules s'attaquent aux réserves de l'organisme (p. ex. dans le foie). Le sucre joue un rôle particulier à cet égard, car il peut, en cas de besoin, être rapidement transformé en énergie (au travail ou lors d'une activité physique par exemple).

L'organisme règle le taux de sucre dans le sang de manière à le maintenir continuellement à un niveau plus ou moins constant. Il veille à ce que le sucre présent dans le sang soit absorbé par les cellules après les repas et qu'il soit transformé directement en énergie ou stocké sous forme de réserve énergétique par le foie.

Entre les repas, le sucre est à nouveau libéré dans le sang à partir de ces réserves.



-  Insuline
-  Sucre/Glucose
-  Aliments
-  Récepteurs




### La glycémie en chiffres

La glycémie normale d'un non-diabétique se situe autour de 5 mmol/l (90 mg/dl). Immédiatement après un repas, la glycémie peut monter jusqu'à 7 mmol/l (126 mg/dl) ou plus, mais elle diminue ensuite à nouveau. Elle ne passe que rarement à des valeurs inférieures à 3,5 mmol/l (63 mg/dl).

L'unité millimoles par litre indique le nombre de particules de sucre (molécules de sucre) par litre de sang. Il existe des millions de particules de sucre dans le sang. Afin d'éviter la manipulation de chiffres aussi élevés, on utilise par conséquent l'unité de la millimole.

### Qu'est-ce que l'insuline et comment agit-elle?

L'insuline est une hormone (du grec : hormao = stimuler). Les hormones sont des substances de signalisation, qui, à de très faibles concentrations, déclenchent des réactions très spécifiques dans l'organisme. L'insuline est formée dans le pancréas. Celui-ci libère l'insuline dans le sang, d'où elle atteint les cellules. Sur la surface de celles-ci, l'insuline rencontre les récepteurs de l'insuline. Ce n'est que lorsque l'insuline se lie à un de ces récepteurs (processus comparable au mécanisme « clé-serrure ») que le sucre peut pénétrer à l'intérieur de la cellule. L'insuline agit donc comme une clé qui ouvre « les portes » des cellules.



5 mmol/l  
(90 mg/dl)


7 mmol/l  
(126 mg/dl)

3,5 mmol/l  
(63 mg/dl)

La glycémie peut également être indiquée en milligrammes de sucre par décilitre (mg/dl) de sang. 10 mmol/l correspondent à 180 mg/dl = 180 mg/100 ml.

Le facteur de conversion des mmol/l en mg/dl est le suivant : **18,016 x mmol/l = mg/dl** et des mg/dl en mmol/l : **0,0555 x mg/dl = mmol/l**.

Toutefois, pour permettre l'entrée de sucre dans les cellules, il faut une « clé ». Cette « clé » est l'insuline.



## Le métabolisme glucidique chez le diabétique

Chez le diabétique, l'organisme ne produit pas ou trop peu d'insuline. Le sucre fourni par l'alimentation ne peut par conséquent pas être absorbé par les cellules et reste dans le sang. La glycémie ne parvient pas à se maintenir à son niveau normal et augmente continuellement. La circulation du sang passe également par les reins. Ceux-ci filtrent les déchets présents dans le sang et les éliminent avec l'urine. Le sucre n'est pas un déchet, et ne devrait donc normalement pas être éliminé avec l'urine. Lorsque la glycémie dépasse une certaine valeur, les reins éliminent également du sucre avec les urines. La glycémie à partir de laquelle les reins commencent à éliminer du sucre avec les urines est également appelée le « seuil rénal ». Celui-ci se situe autour de 10 mmol/l (180 mg/dl).

### Symptômes du diabète de type 1

Au moment du diagnostic, la plupart des diabétiques de type 1 souffrent déjà d'un déficit sévère d'insuline. Cette carence marquée fait rapidement augmenter la glycémie et provoque des symptômes caractéristiques comme :

- Une soif intense et des envies fréquentes d'uriner
- Une perte de poids
- De la fatigue
- Une plus grande fragilité de l'organisme aux infections bactériennes et aux mycoses.
- Des pertes de connaissance

Le médecin constatera que la glycémie est très élevée et que l'urine contient du sucre et des substances appelées « cétones ».


Les cétones sont des substances qui se forment lorsque l'organisme dégrade des lipides afin d'obtenir de l'énergie.

### Symptômes du diabète de type 2

Le diabétique de type 2 produit encore lui-même de l'insuline. Le déficit d'insuline est moins marqué et la glycémie n'augmente pas aussi vite que chez le diabétique de type 1. C'est pourquoi les symptômes sont nettement moins prononcés. Le diagnostic du diabète n'est souvent posé qu'après des années. Les symptômes ci-après peuvent apparaître :

- Fatigue, baisse des performances
- Des picotements et une rigidité des mains et des pieds
- Une plus grande susceptibilité aux infections
- Une cicatrisation ralentie des plaies et parfois des démangeaisons aux pieds
- Une soif intense et des envies fréquentes d'uriner

Etant donné que le diabète de type 2 n'est souvent pas reconnu durant des années, des complications sont déjà souvent présentes au moment du diagnostic. C'est pourquoi il est extrêmement important de dépister le diabète de type 2 aussi vite que possible. Un traitement adéquat permet d'éviter ou tout au moins de retarder les complications tardives du diabète. (voir page 23)



## L'alimentation


Manger doit être un plaisir. En même temps, l'alimentation est un facteur important pour la santé. Notre alimentation fournit les nutriments, les vitamines et les substances minérales dont notre organisme a besoin pour rester en bonne santé et actif. Contrairement à une opinion largement répandue, l'alimentation saine des diabétiques est très semblable à l'alimentation saine des personnes sans diabète.

### Les nutriments

Une alimentation saine se compose de grandes quantités d'hydrates de carbone et de peu de graisses et de protéines. La pyramide alimentaire illustre quels sont les aliments de base pour les diabétiques et lesquels doivent être utilisés de manière plus parcimonieuse.

L'énergie (calories/joules) fournie par l'alimentation devrait provenir des nutriments suivants :

à hauteur de 50 % des hydrates de carbone  
à hauteur de 30 % des lipides  
à hauteur de 20 % des protéines



### Les aliments et la glycémie

Les aliments contiennent généralement plusieurs substances nutritives. L'ampleur et la vitesse de l'augmentation de la glycémie dépendent du type d'hydrates de carbone ainsi que de la teneur en d'autres nutriments et en fibres alimentaires. En règle générale, la glycémie augmente proportionnellement avec la quantité d'hydrates de carbone, c'est-à-dire qu'elle augmente d'autant plus que l'aliment contient beaucoup d'hydrates de carbone. Les hydrates de carbone sont scindés dans le tractus gastro-intestinal en résidus de sucre et absorbés par le sang. Les résidus de sucre sont absorbés par les cellules à l'aide de l'insuline (clé). L'approvisionnement énergétique des organes est ainsi assuré par le sucre. Par conséquent, le taux d'insuline augmente après la prise d'aliments quand la présence de sucre dans le sang est élevée.

### Guide alimentaire pour diabétiques

L'alimentation est un aspect important de la prise en charge du diabète. Un plan alimentaire est recommandé pour toutes les personnes diabétiques, en particulier pour les diabétiques de type 2, qui doivent souvent ajuster leurs habitudes alimentaires. Demandez l'aide d'une diététicienne diplômée et discutez avec elle de votre plan alimentaire personnalisé. En plus de l'alimentation, l'exercice physique est très important.

Toutes les formes d'exercice physique (ménage, promenades, jogging, etc.) améliorent la sensibilité des cellules vis-à-vis de l'insuline et font ainsi baisser le taux de glycémie. Ce qui importe n'est pas le type d'activité physique mais la régularité avec laquelle celle-ci est pratiquée. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le chapitre «Diabète et sport».

## la traitement du diabète sucré

### formes de traitement

Simone Lensbøl Type2 Danmark

## Le traitement du diabète sucré

### Les différentes formes de traitement

Il n'existe à ce jour aucun moyen de guérir le diabète. La principale condition pour mener une vie normale et profiter de la meilleure qualité de vie possible, avec la meilleure protection possible contre les conséquences tardives, est un traitement adéquat, instauré à un stade précoce de la maladie.

Le traitement vise une **normalisation de la glycémie**, c'est-à-dire que la glycémie devrait être aussi proche que possible de celles des personnes non diabétiques. Idéalement le taux d'HbA1c devrait être inférieur à 7%. Cependant, cela doit être discuté individuellement avec le médecin.

### Le traitement du diabète de type 1

Comme nous l'avons mentionné auparavant, le diabétique de type 1 présente un déficit absolu d'insuline dès le diagnostic et a donc besoin dès le début d'un apport extérieur d'insuline. Bien qu'aujourd'hui, en Suisse, l'insuline soit identique ou très semblable à l'insuline du pancréas humain, il existe une différence entre l'insuline sécrétée par le pancréas et l'insuline injectée. Cette dernière atteint la circulation sanguine par une autre voie. Dans l'organisme des personnes non diabétiques, les cellules pancréatiques productrices d'insuline mesurent la glycémie et libèrent ensuite directement dans le sang les quantités d'insuline nécessaires. L'insuline sécrétée n'agit dans le sang que durant quelques minutes. Lorsque de plus grandes quantités d'insuline sont nécessaires, le pancréas met à disposition plus d'insuline. La quantité d'insuline dont l'organisme a besoin est ainsi fournie rapidement et avec précision.

Le diabétique par contre doit s'injecter de l'insuline sous la peau, d'où elle est absorbée par le sang de manière continue. Ce processus nécessite un peu de temps.

La totalité de l'insuline injectée est absorbée dans le sang – et ce indépendamment de la glycémie à ce moment.

De ce fait, il n'est pas toujours facile de régler correctement la glycémie.

### Le traitement du diabète de type 2

Dans le diabète de type 2, le pancréas produit encore suffisamment d'insuline endogène – au moins au début. Toutefois, il existe souvent une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les cellules de l'organisme nécessitent de plus grandes quantités d'insuline pour absorber la même quantité de sucre que les personnes ne présentant pas de résistance à l'insuline.

L'excès pondéral est souvent la principale cause de la résistance à l'insuline. C'est pourquoi le traitement du diabète de type 2 consiste en premier lieu à équilibrer son alimentation et à réduire sa consommation de lipides, ainsi qu'à augmenter son activité physique. L'objectif est de perdre du poids.

## le traitement médicamenteux

### formes de traitement

Le nombre d'antidiabétiques a considérablement augmenté au cours des dernières années et un large éventail de produits est disponible en Suisse. Les groupes de principes actifs les plus utilisés en Suisse sont énumérés ci-dessous par ordre alphabétique et font l'objet d'une brève explication.

### Agonistes du récepteurs du GLP-1

Les agonistes du récepteurs du GLP-1 sont utilisés pour le traitement du diabète de type 2 et parfois aussi en cas de surpoids ou d'obésité. Ils se comportent comme l'hormone naturelle GLP-1 et se lient au récepteur du GLP-1. Ainsi, en fonction de la glycémie, ils stimulent la sécrétion d'insuline par les cellules bêta du pancréas et inhibent la sécrétion de glucagon. En outre, ils ralentissent la vidange gastrique et augmentent la sensation de satiété, ce qui peut entraîner une perte de poids.

### Analogues de l'insuline

L'insuline est une hormone qui est produite dans le pancréas. Les insulines modernes, appelées « analogues de l'insuline », sont similaires mais non identiques à l'insuline humaine. Elles ont été légèrement modifiées structurellement, de sorte que soit elles sont absorbées plus rapidement que l'insuline humaine dans la circulation sanguine (dans le cas d'insulines à courte durée d'action), soit elles ont une durée d'action plus longue (dans le cas d'insulines à longue durée d'action). La plupart des analogues de l'insuline sont disponibles sous forme de solution limpide. Aussi bien les diabétiques de type 1 que les diabétiques de type 2 peuvent ou doivent utiliser les insulines comme traitement. En ce qui concerne les diabétiques de type 1, l'injection d'insulines est essentielle, car les cellules du pancréas du patient ne produisent pas ou seulement très peu d'insuline.

### Metformine

La metformine est souvent utilisée comme premier traitement médicamenteux lorsqu'un changement d'alimentation, une perte de poids et un exercice physique plus important n'ont pas permis d'obtenir une amélioration du taux de glycémie. L'effet antidiabétique est atteint par l'inhibition de la nouvelle formation de glucose dans le foie.

### Inhibiteurs de la DPP-4

Les inhibiteurs de la DPP-4 sont une classe de principes actifs utilisés pour traiter le diabète de type 2. Ils abaissent le taux de glycémie en protégeant l'hormone intestinale GLP-1 de sa dégradation. Le GLP-1 est une hormone naturelle qui, entre autres, stimule l'excrétion d'insuline.



Christian Petersen Type2 Danmark

## la traitement du diabète sucré

### formes de traitement

Kelly Hector Type1 États-Unis



## la traitement du diabète sucré

### formes de traitement

Jonathan Charlesworth Type1 Afrique du Sud



#### Insulines à courte durée d'action

##### (» insulines bolus « ou » insulines prandiales «) :

Après un repas, le besoin d'insuline augmente rapidement, parce que le sucre est absorbé dans le sang. Des insulines à courte durée d'action sont injectées afin de couvrir ce besoin accru d'insuline. Les insulines à courte durée d'action sont donc également appelées des « insulines prandiales » ou des « insulines bolus ». Leur action est très rapide. L'insuline bolus peut par conséquent, en fonction de la préparation, être injectée quelques minutes avant le repas ou pendant le repas. L'injection d'une insuline bolus évite une augmentation trop importante du taux de glycémie après le repas.

#### Profil d'action des insulines à courte durée d'action :

24 heures



Alex Silverberg Type1 Suède


#### Insulines à longue durée d'action

##### (» insulines basales « ou » insulines retard «) :

Tout être humain a également besoin de faibles quantités d'insuline entre les repas et durant la nuit afin que le métabolisme de base puisse être assuré. Ce besoin de base persiste durant toute la journée et la nuit, à un niveau peu élevé. C'est pourquoi les insulines à longue durée d'action sont appelées « insulines de base », « insulines basales » ou « insulines retard », car elles sont absorbées dans le sang durant une longue période après l'injection. En raison de la longue durée d'action des nouveaux analogues d'insuline basale, une administration une fois par jour, de préférence tous les jours à la même heure, est généralement suffisante.

#### Profil d'action des insulines à longue durée d'action :

24 heures



Jose Antonio Guarda Type2 Chili



## la traitement du diabète sucré


### forme de traitement

Alex Silverberg Type1 Suède

#### Insulines mixtes

Les insulines mixtes peuvent permettre de réduire le nombre d'injections car elles contiennent aussi bien une fraction d'insuline à courte durée d'action qu'une fraction d'insuline à longue durée d'action. Les insulines mixtes sont injectées 1 à 2 fois par jour (avant un repas). L'augmentation rapide de la glycémie après chaque repas et le taux de glycémie entre les repas peuvent ainsi être régulés.

#### Profil d'action des insulines mixtes :



Huw Bevan Type2 Grande-Bretagne

## la traitement du diabète sucré

### formes de traitement



Benny Sporre Type2 Suède

#### Inhibiteurs du SGLT2

Les inhibiteurs du SGLT2 sont des antidiabétiques pour les personnes souffrant de diabète de type 2. Les inhibiteurs du SGLT2 réduisent l'absorption de glucose par les reins, entraînant ainsi une augmentation de l'excrétion de glucose par l'urine, ce qui fait baisser le taux de glycémie dans le sang et favorise la perte de calories. Leur effet est indépendant de l'insuline.

#### Sulfonylurées

Les sulfonylurées sont utilisées pour le traitement du diabète de type 2. Elles augmentent la sécrétion d'insuline par les cellules du pancréas et réduisent ainsi la glycémie.


## injection

### technique d'injection

#### Technique d'injection

Avant de procéder à l'injection, vérifiez que vous utilisez le bon médicament. Pour chaque injection, utilisez systématiquement une nouvelle aiguille. L'insuline ou les analogues du GLP-1 peuvent être injectés dans le ventre ou la cuisse. Il est toutefois important que l'insuline soit toujours injectée dans la même région du corps et que l'on n'alterne pas entre le ventre et la cuisse. Il est essentiel de changer toujours de site d'injection à l'intérieur d'une région du corps afin d'éviter les durcissements et les épaisissements du tissu adipeux (lipodystrophies). Les lipodystrophies ne sont pas seulement inesthétiques, elles modifient en outre l'absorption d'insuline et peuvent être à l'origine d'un mauvais contrôle de la glycémie. Les sites d'injection doivent être distants d'environ 3 à 4 cm, soit la largeur de deux doigts, et les injections ne doivent être effectuées que dans une peau saine, exempte de cicatrices.

La technique d'injection doit être expliquée et faire l'objet d'une démonstration par le médecin ou une infirmière-conseil en diabétologie. En principe, on forme un pli cutané avec le pouce et l'index et on injecte verticalement dans le pli cutané.



**Important :**  
vérifier à chaque fois que vous injectez l'insuline correctement.



Nova Holmberg Type1 Suède

Pour que l'insuline puisse se distribuer complètement, laissez l'aiguille en place pendant au moins six secondes après l'injection avant de la retirer. Il est important de tenir l'aiguille aussi fermement que possible afin d'éviter l'apparition de taches bleues sur le site d'injection. L'injection doit toujours être effectuée dans le tissu adipeux situé sous la peau (sous-cutané). L'insuline ne doit pas être injectée dans les muscles, car son effet est alors imprévisible.

Les aiguilles sont destinées à un usage unique et doivent donc être remplacées avant chaque injection. Après une seule injection, l'aiguille est légèrement émoussée, ce qui peut engendrer des douleurs lors d'une nouvelle injection. La stérilité n'est plus garantie et des restes d'insuline peuvent boucher l'aiguille, ce qui peut perturber le fonctionnement de l'injecteur.

Il est recommandé de retirer l'aiguille avant d'emporter le stylo sur soi, car le médicament pourrait s'écouler de l'aiguille ou de l'air pourrait pénétrer dans le stylo.



## le réglage de la glycémie

### valeurs-cibles, correction de la glycémie

Jim Sheeder Type2 États-Unis

## Le réglage de la glycémie

#### Quelles sont les valeurs-cibles à atteindre ?

Le traitement vise à porter la glycémie du diabétique aux valeurs habituelles des personnes non diabétiques. On sait aujourd'hui qu'un bon contrôle de la glycémie permet de prévenir l'apparition de complications ou de ralentir l'évolution de la maladie. Toutefois, il n'est pas toujours possible d'obtenir des glycémies normales. Dans certains cas, une glycémie réglée sur des valeurs basses peut entraîner un risque important d'hypoglycémie (taux de sucre trop bas). C'est pourquoi le réglage optimal doit être déterminé en concertation avec le médecin.

#### Les taux de glycémie suivants peuvent être pris en compte à titre indicatif

	Réglage optimal	Réglage acceptable	Réglage insuffisant
Glycémie à jeun	5.0-7.0 mmol/l	<8.0 mmol/l	>8.0 mmol/l
Glycémie postprandiale (2 heures après le repas)	<8.0 mmol/l	<10.0 mmol/l	>10.0 mmol/l

#### Correction de la glycémie

Un diabétique sous traitement intensif à l'insuline essaie d'obtenir une glycémie aussi normale que possible. Pour y arriver, il doit mesurer sa glycémie plusieurs fois par jour et la corriger lorsque c'est nécessaire. Durant sa formation, il apprendra comment corriger sa glycémie.

En gros, les règles sont les suivantes :

- 1 unité d'insuline provoque une baisse de la glycémie de 2 à 3 mmol/l (36 à 54 mg/dl) env.
- 10 grammes de glucose provoquent une hausse de la glycémie de 2 à 3 mmol/l (36 à 54 mg/dl) env.

#### Déviations de la glycémie

Il n'est pas facile, pour un diabétique, de maintenir sa glycémie à des valeurs normales. Chez le non-diabétique, l'organisme règle automatiquement la glycémie de sorte que celle-ci ne soit jamais ni trop élevée ni trop basse. Le diabétique par contre doit adapter l'insuline qu'il s'injecte non seulement à ses repas mais également à son activité physique. A cela s'ajoutent d'autres facteurs comme une tension psychique ou la maladie, qui influencent également le besoin d'insuline de l'organisme. Ces influences peuvent entraîner une déviation de la glycémie.

La glycémie peut être soit

- trop basse (hypoglycémie)
- trop élevée (hyperglycémie)

#### Hypoglycémie (taux de sucre trop bas)

Lorsque la glycémie est trop basse (inférieure à 3,9 mmol/l ou 70 mg/dl), on parle d'hypoglycémie. Les symptômes de l'hypoglycémie varient d'un individu à l'autre. Il est important que vous appreniez à reconnaître vos propres symptômes. Chez la plupart des diabétiques, la transpiration et/ou des frissons sont les premiers signes d'alarme, mais une faiblesse, une irritabilité, la faim, la fatigue, une somnolence, des maux de tête et de légers troubles visuels sont également des symptômes fréquents.

Lorsque la glycémie continue à baisser fortement, il peut y avoir perte de connaissance.

## le réglage de la glycémie hypoglycémie

### Que faut-il faire ?

Les premiers signes d'une hypoglycémie nécessitent des mesures rapides : il faut immédiatement manger ou boire quelque chose contenant du sucre, p. ex.

- 3 à 5 morceaux de sucre (10 g) ou de sucre de raisin (10 g)
- 1 verre (0,2 l) de jus d'orange, du Coca-Cola normal ou d'autres boissons sucrées (pas de boisson light !)

Il est important de consommer ensuite un aliment riche en hydrates de carbone, afin d'éviter une récurrence de l'hypoglycémie. Une tranche de pain, une pomme ou un aliment semblable conviennent dans ces cas. Lorsque l'hypoglycémie est remarquée très tôt, il suffit souvent de manger un à deux morceaux de fruits, des biscottes ou une tranche de pain.

**Important :**  
**manger d'abord, mesurer ensuite !**



Dès que l'hypoglycémie a été traitée, il faut mesurer la glycémie. Des mesures supplémentaires après 30 à 60 minutes peuvent éventuellement être utiles.

### Dans quelles situations une hypoglycémie apparaît-elle ?

Les hypoglycémies peuvent apparaître :

- lorsque l'on mange moins d'hydrates de carbone que d'habitude
- lorsqu'une quantité trop importante d'insuline a été injectée
- lors d'une activité physique plus intense ou après celle-ci

- après la consommation d'alcool. (L'alcool empêche la libération du glucose à partir du foie et peut entraîner des glycémies trop basses même 12 heures après sa consommation).

### Comment prévenir une hypoglycémie ?

La glycémie doit être contrôlée régulièrement – c'est la seule façon pour un diabétique d'apprendre à évaluer correctement la manière dont sa glycémie réagit. Afin de prévenir une hypoglycémie, il est recommandé de manger environ 20g d'hydrates de carbone avant des activités de courte durée non planifiées. Avant des activités planifiées plus importantes, il peut être nécessaire de réduire la dose d'insuline – la manière d'adapter la dose doit être discutée avec le médecin ou une infirmière-conseil en diabétologie (voir également le chapitre « Diabète et sport »).

### Lors d'une hypoglycémie :

Il est indispensable que la personne diabétique ait sur elle, dans toutes les situations et en tous lieux, suffisamment de sucre en morceaux ou de sucre de raisin ainsi que sa carte de diabétique dûment remplie. Il est recommandé d'expliquer en détail à ses proches et amis comment se comporter en cas d'hypoglycémie et comment utiliser l'« antidote » glucagon en cas de besoin. Le glucagon agit comme un contre-régulateur de l'insuline en libérant les réserves hépatiques de sucre. Lorsque la personne diabétique est encore consciente, une tierce personne peut également lui placer **un morceau de sucre ou du sucre de raisin** entre la joue et les dents.

La trousse d'urgence d'un diabétique contiendra toujours du sucre en morceaux !



## le réglage de la glycémie hypoglycémie, hyperglycémie

### Hypoglycémie avec perte de connaissance :

Lorsqu'une hypoglycémie n'est pas traitée rapidement, elle peut provoquer une perte de connaissance avec des crampes. Cet état nécessite l'intervention immédiate des personnes présentes. La personne ayant perdu connaissance doit être couchée sur le côté, dans une position de sécurité, et il ne faut en aucun cas lui donner à boire (risque d'étouffement !). Il faut immédiatement aviser un médecin, et si l'on dispose de glucagon, l'injecter dans un muscle ou le tissu adipeux sous-cutané.

**En cas de doute, injecter toujours immédiatement du glucagon, qui n'a aucun effet négatif pour l'organisme, même en l'absence d'hypoglycémie.**

Si la personne diabétique n'a pas repris connaissance, il faut immédiatement appeler un médecin ou une ambulance.

Dès que le diabétique a repris connaissance, il doit immédiatement prendre du sucre de raisin et/ou d'autres aliments ou boissons contenant des hydrates de carbone, et mesurer sa glycémie.

### Hyperglycémie (taux de sucre trop élevé)

Lorsque la glycémie est trop élevée, on parle d'hyperglycémie. Celle-ci peut être déclenchée par les facteurs suivants :

- repas trop copieux
- dose d'insuline trop faible
- trop peu d'activité physique
- maladies ou autres types de stress
- grossesse
- règles

Une glycémie trop élevée peut généralement être normalisée en évitant sa cause ou en adaptant le traitement. Si la cause de la glycémie trop élevée n'est pas connue, il convient de consulter un médecin.

Les glycémies légèrement trop élevées, dues à une erreur de régime, peuvent généralement être corrigées par une diminution de la consommation d'hydrates de carbone lors du prochain repas.

Les glycémies élevées dues à des maladies ou à une quantité insuffisante d'insuline injectée (injection oubliée !) peuvent être corrigées par l'administration supplémentaire de petites quantités d'insuline à courte durée d'action.



Christian Petersen Type2 Danmark

## le réglage de la glycémie

### symptômes de l'hyperglycémie

#### Les symptômes de l'hyperglycémie

De nombreux symptômes sont susceptibles d'indiquer une glycémie excessivement élevée. Dans bien des cas toutefois, même des glycémies relativement élevées ne sont accompagnées d'aucun symptôme. Il est toujours important de prendre en considération le fait que des hyperglycémies fréquentes et prolongées augmentent le risque de conséquences tardives du diabète, même si aucun symptôme ne se manifeste sur le moment.

#### Les symptômes des glycémies élevées sont :


- soif et envies fréquentes d'uriner
- fatigue et somnolence
- troubles visuels
- perte de poids
- acidocétose/perde de connaissance

Lors d'une hyperglycémie prolongée :

- crampes dans les jambes
- mauvaise cicatrisation

#### Acidocétose diabétique/cétonurie

Lorsque la quantité d'insuline injectée est trop faible, le sucre ne peut pas être absorbé par les cellules en raison du déficit d'insuline et le corps brûle alors de la graisse pour produire de l'énergie. La dégradation de graisse produit des « corps cétoniques » ou « cétones ». L'une de ces cétones est l'acétone, qui apparaît dans l'urine et l'air expiré (odeur douceâtre). C'est un signe d'hyperglycémie. Lorsque cet état persiste durant des heures ou des jours, les mêmes symptômes que lors d'une absence de traitement du diabète apparaissent : grande quantité d'urine, soif, perte de poids. Une perte d'appétit, des nausées et des vomissements peuvent également se manifester. Les cétones peuvent être détectées à l'aide d'un simple test réalisé dans l'urine. Lorsque la glycémie continue à augmenter, cela peut provoquer une acidocétose et une perte de connaissance. C'est pourquoi il convient de prendre contact avec le médecin également lors de glycémies très élevées.



## les conséquences tardives du diabète

### atteintes tissulaires et organiques

## Les conséquences tardives du diabète (complications tardives)


#### Que sont les conséquences tardives du diabète ?

Les complications tardives sont des atteintes organiques qui apparaissent suite à des glycémies durablement élevées ou répétées. Elles peuvent se manifester 10 à 50 ans après le début du diabète.

#### Glycosylation de protéines

On sait aujourd'hui que le glucose réagit chimiquement avec certaines protéines présentes dans l'organisme, ce qui entraîne une « glycosylation de protéines ». Le glucose se détache des protéines lorsque la glycémie se normalise. Lors de glycémies durablement ou fréquemment élevées, de nombreuses protéines subissent toutefois des modifications durables (irréversibles). Ces protéines ne sont plus fonctionnelles et peuvent entraîner des atteintes tissulaires.

#### Zones qui sont le plus souvent touchées par les conséquences tardives



#### Atteintes tissulaires et organiques

Les nerfs, les reins et les yeux sont particulièrement vulnérables à ces atteintes tissulaires. Les atteintes nerveuses se manifestent par exemple par une sensation d'engourdissement, des douleurs, des picotements, etc., dans les extrémités (neuropathies).

Les affections oculaires (rétinopathie) peuvent provoquer une cécité et les maladies rénales (néphropathies) peuvent entraîner une perte des fonctions rénales, qui peut être totale. En dernier, les grands vaisseaux sanguins (artères) et le cerveau peuvent également être touchés, ce qui peut provoquer des maladies cardiovasculaires, par exemple un infarctus du myocarde.

#### Le pied diabétique

En raison de la neuropathie décrite plus haut (atteintes des nerfs) provoquée par le diabète, les pieds doivent faire l'objet d'une attention particulière. Suite à la perte des capacités sensorielles, il est possible que des surcharges et des plaies des pieds passent inaperçues. La mauvaise circulation augmente la sensibilité aux affections et ralentit la cicatrisation. Dans le pire des cas, cela peut conduire à une amputation. Vous trouverez des conseils relatifs aux contrôles quotidiens des pieds à la page 26.



## prendre son diabète en main en charge de son diabète

Simone Lensbøl Type2 Danemark

### Prendre son diabète en main

#### Prise en charge de son diabète

Prendre son diabète en main signifie assumer ses propres responsabilités et participer activement au traitement. Il est très important que les personnes diabétiques agissent de manière responsable à l'égard de leur maladie car de nombreux facteurs de la vie quotidienne influencent la glycémie. Les personnes diabétiques doivent apprendre à prendre soin d'elles-mêmes, à décider de ce qu'elles mangent et à quel moment, et avec quelle intensité exercer une activité physique. De nombreux spécialistes, des centres de conseil médicaux, en diabétologie et en diététique, sont à disposition des personnes diabétiques et peuvent apporter une aide très utile. En fin de compte, la manière dont la personne diabétique accepte son diabète est décisive car l'attention qu'elle porte à sa maladie en dépend.

#### Contrôles médicaux réguliers

Il est très important de procéder à des contrôles médicaux réguliers de la glycémie et du taux de HbA<sub>1c</sub> (voir plus bas), ainsi que des yeux, des reins, des nerfs et du système cardiovasculaire, afin que d'éventuelles atteintes puissent être traitées à temps. Des contrôles des lipides sanguins (cholestérol) et de la pression artérielle sont également recommandés.

#### Hémoglobine glycosylée (HbA<sub>1c</sub>)

Le glucose se lie aussi aux globules rouges, notamment à l'hémoglobine. Il se forme alors de l'hémoglobine glycosylée, pouvant être mesurée sous la forme du taux de HbA<sub>1c</sub>, qui est indiqué en pourcentage d'hémoglobine glycosylée. Le taux de HbA<sub>1c</sub> est mesuré tous les 3 mois environ, ce qui correspond à la durée de vie des globules rouges. Cette mesure permet d'obtenir une sorte de moyenne de la glycémie durant cette période.

Le tableau ci-contre montre le lien approximatif entre le taux de HbA<sub>1c</sub> et la glycémie moyenne.

Une personne non diabétique présente un taux de HbA<sub>1c</sub> situé entre 4,0 et 6,4%

HbA <sub>1c</sub> en %	Glycémie en mmol/l
5,5	5,0
6,1	6,0
6,6	7,0
7,2	8,0
7,7	9,0
8,3	10
8,8	11
9,4	12
9,9	13

### prendre son diabète en main mesure de la glycémie

#### Connaissances de base pour l'autocontrôle

Lorsqu'un diabète est nouvellement diagnostiqué, il est important que le diabétique se familiarise avec cette maladie métabolique et apprenne comment utiliser les médicaments et réaliser les mesures au quotidien. Le diabète nécessite une attention constante pour que la glycémie puisse être réglée correctement.

Une certaine expérience est nécessaire jusqu'à ce que le diabétique sache:

- quels sont les facteurs qui influencent la glycémie, et quelle est l'ampleur de cette influence. D'une façon générale, on peut affirmer que les repas font monter la glycémie, que l'activité physique possède plutôt une action hypoglycémisante et que les maladies et le stress psychique peuvent provoquer une augmentation de la glycémie. Ces effets sont toutefois variables d'un patient à l'autre.
- comment et à quel moment mesurer la glycémie, et comment évaluer les résultats
- comment une alimentation saine influence le contrôle de la glycémie.

#### La mesure de la glycémie

La mesure de la glycémie est un facteur très important pour le réglage du diabète. En particulier les personnes qui utilisent une insulinothérapie intensive doivent procéder à plusieurs mesures et enregistrements des glycémies par jour. Le traitement peut ainsi être adapté si nécessaire.

En effet, il peut arriver que le réglage de la glycémie ne soit pas optimal, même si aucun symptôme de la maladie n'est présent. La mesure de la glycémie est très simple. La teneur en sucre dans le sang peut être mesurée à l'aide d'un lecteur de glycémie.

#### Quand une mesure de la glycémie est-elle utile ?

La fréquence des mesures de la glycémie dépend du type de traitement. Il est important de discuter de ce sujet avec son médecin.

Chaque mesure de la glycémie fournit à la personne diabétique des informations relatives aux effets des différents facteurs influant sur le taux de glycémie.

Une certaine expérience est toutefois nécessaire pour interpréter les mesures et pouvoir les utiliser pour adapter le réglage du diabète. C'est pourquoi il est important de prendre du temps pour l'interprétation, aussi bien au début du traitement du diabète qu'ultérieurement, et de discuter avec son médecin.

Aujourd'hui, il existe une variété de systèmes de surveillance du glucose avec lesquels on peut mesurer la glycémie à tout moment. Grâce à un capteur sur la peau et à un appareil qui reçoit les signaux, les taux de glycémie peuvent être lus en permanence.

Cela comporte cependant le risque de mesurer trop souvent la glycémie et d'essayer trop souvent, aux moindres variations, de réduire la glycémie par des médicaments.

#### La mesure de la glycémie est très utile dans les situations suivantes :

- avant les repas principaux (déjeuner, dîner, souper)
- 1- 2 heures après les repas
- avant le coucher
- éventuellement la nuit (aux alentours de 03:00 heures)
- **avant et après** une activité sportive
- avant de longs trajets en voiture
- chaque fois que l'on suspecte une hypoglycémie ou une hyperglycémie
- en cas de maladie ou de stress

Il est important de discuter avec un spécialiste afin de décider du nombre et du moment optimal des mesures de la glycémie. Un journal du diabète peut également fournir une base de discussion utile pour les entretiens de conseils et le traitement médical.

## prendre son diabète en main

### journal du diabète, contrôle quotidien des pieds

#### Le journal du diabète

Le journal du diabète peut être un outil important pour le réglage du diabète.

Les diabétiques y inscrivent les glycémies mesurées, accompagnées de l'heure et de la date. Il est également possible d'y noter les injections d'insuline : type d'insuline et dose injectées ainsi qu'heure et date de l'injection. D'autres inscriptions importantes sont les repas, les activités physiques, la maladie, le stress (les émotions) et les mesures prises pour régler la glycémie. Toutes les inscriptions sont très utiles afin de permettre de reconnaître des particularités du contrôle glycémique d'un diabétique et de prendre les mesures qui s'imposent.

**Remarque :** les journaux du diabète sont disponibles auprès des associations régionales du diabète ou des infirmières en diabétologie.

#### Aides, contrôle et soins

De nos jours, une grande variété d'aides sont disponibles pour les diabétiques. Cela commence par divers glucomètres, diverses aiguilles, etc. et s'étend aux aides numériques, comme les applications, les forums des patients ou divers sites internet (tels que [www.diabetesschweiz.ch/fr](http://www.diabetesschweiz.ch/fr)), qui contiennent des informations précieuses sur le diabète. Ces aides peuvent non seulement avoir un effet positif sur la vie quotidienne et la qualité de vie, mais aussi aider à prévenir les complications du diabète.


#### Consultation médicale

Les personnes diabétiques ont besoin d'un suivi médical durant toute leur vie. Il est important qu'elles aient une relation positive de confiance avec leur médecin. La possibilité d'entretiens réalisés dans un esprit ouvert, qui laissent la place à l'expression de soucis et de peurs, fait partie de cette relation de confiance.

Dans de nombreux cas, il est également judicieux de consulter un médecin spécialisé en diabétologie (diabétologue).

#### Contrôle quotidien des pieds

Comme décrit auparavant, il est très important pour les diabétiques de procéder à des contrôles quotidiens de leurs pieds. En raison de la neuropathie (atteinte des nerfs), les pieds sont plus sujets aux blessures et la cicatrisation peut être ralentie. Un examen et des soins quotidiens des pieds peuvent grandement aider à éviter de graves problèmes de pied.



Adri van der Wielen HCP Afrique du Sud



Diogo Santos Type1 Portugal

## Situations particulières

#### Diabète et sport

Le sport et l'activité physique sont importants pour tout le monde. Pour les diabétiques, l'activité physique revêt une importance particulière, car elle influence la glycémie et contribue dans une large mesure au contrôle global du diabète.

#### Disciplines sportives et activités physiques particulièrement appropriées

En principe, toute occasion d'exercer une activité physique dans la vie quotidienne devrait être mise à profit. Les sports d'endurance d'intensité moyenne comme le vélo, la course à pied et la marche sont particulièrement appropriés pour les personnes diabétiques.

Une certaine prudence est de mise lors de la pratique de sports qui entraînent un risque supplémentaire d'hypoglycémie, par exemple le vol delta, la plongée, etc.

Les exercices physiques programmés ne sont pas les seules activités physiques bénéfiques. Les activités de la vie quotidienne, comme monter les escaliers, se déplacer à pied plutôt qu'en voiture, faire du vélo, promener le chien, etc. sont également importantes.

Il peut être utile de demander conseil à un spécialiste afin de discuter du type de sport adapté, et de l'intensité qui convient. Il est important de débiter lentement de nouvelles activités physiques et de n'augmenter l'intensité que progressivement, en fonction du niveau d'entraînement.

#### L'activité physique régulière

- diminue votre besoin quotidien d'insuline
- améliore votre bien-être général
- vous aide à perdre du poids ou à le maintenir
- renforce vos muscles, vos articulations et vos os
- diminue votre taux de cholestérol
- atténue votre risque d'infarctus du myocarde

Les personnes diabétiques peuvent exercer autant d'activité physique que les personnes sans diabète. Toutefois, chez les diabétiques, une attention particulière s'impose dès avant le début de l'activité physique. Il est important de prendre en compte l'état de santé général, comment on se sent sur le moment et le réglage de la glycémie.

#### Comment se comporte la glycémie lors d'une activité physique :

- Lors d'une activité physique, l'organisme a besoin de plus d'énergie et consomme donc plus de glucose à partir du sang. En présence d'insuline, il peut s'ensuivre une diminution de la glycémie.
- Une activité physique très intense (surcharge) peut toutefois également conduire à une libération d'hormones du stress, qui provoquent une hausse passagère de la glycémie.



Noriko Maruyama Type1 Japon

## situations particulières

### diabète et activité physique

- Après d'importants efforts physiques nécessitant beaucoup d'énergie et qui ont fait appel aux réserves de l'organisme, l'organisme remplace les réserves consommées, c'est-à-dire qu'il stocke à nouveau du glycogène dans les cellules musculaires et le foie. Pour cela, l'organisme puise du glucose dans le sang, ce qui provoque à son tour une diminution de la glycémie. (effet de remplissage musculaire)
- L'activité physique régulière augmente la sensibilité à l'insuline des récepteurs tissulaires et diminue ainsi le besoin d'insuline.

**Conclusion : une activité physique adaptée provoque une diminution de la glycémie. C'est pourquoi les besoins d'insuline avant et après l'activité baissent en fonction de l'effort fourni. Il est également important de consommer des hydrates de carbone supplémentaires.**

#### Points importants à prendre en compte avant l'activité physique :

- Prévention des hypoglycémies : consommer éventuellement des hydrates de carbone supplémentaires, réduire la dose d'insuline
- Mesurer la glycémie
- Avoir sur soi des réserves d'hydrates de carbone
- Boire suffisamment
- Préparer le traitement de l'hypoglycémie (avoir sur soi du sucre, du glucagon, informer les personnes qui vous accompagnent)

#### Effort physique de faible intensité

Les activités physiques qui sont pratiquées régulièrement ou auxquelles l'organisme est déjà adapté ou entraîné ne nécessitent généralement pas de repas supplémentaire. Par exemple : promenade avec le chien, faire les courses à pied.

#### Effort physique d'intensité moyenne

Les activités physiques qui durent plus d'une heure et qui représentent des efforts inhabituels nécessitent généralement l'absorption d'hydrates de carbone supplémentaires. C'est ainsi par exemple qu'une heure de sport, de jardinage, de nettoyage des vitres etc. nécessitent un en-cas sous la forme de pain, d'une barre de céréales, de fruits, etc. La plupart du temps, 10-20 g d'hydrates de carbone suffisent. Si l'effort dure plus d'une heure, des hydrates de carbone supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. En règle générale, on recommande 10 g d'hydrates de carbone par demi-heure lors d'un effort moyen.



#### Activité physique intense

Des activités physiques intenses comme le marathon, le ski de fond, une randonnée en montagne ou un long parcours de plusieurs heures en vélo nécessitent une planification adaptée individuellement des repas, en fonction de la durée de l'effort, de la glycémie mesurée, du traitement médicamenteux et du niveau d'entraînement. Il convient de consommer 10g supplémentaires d'hydrates de carbone toutes les 30 à 45 minutes.

#### Important : lorsque la glycémie avant l'entraînement est trop élevée ou trop basse

Avant l'activité sportive, la glycémie doit être bien contrôlée. Elle ne doit être ni trop élevée, ni trop basse.

Il ne faut pas s'entraîner si la glycémie dépasse 15 mmol/l (270 mg/dl) ou si l'urine contient des corps cétoniques. Lorsque la glycémie est trop élevée, il faut faire une injection d'insuline et attendre que la glycémie se normalise et qu'aucune cétone ne soit détectable dans l'urine avant de commencer l'entraînement. Si la glycémie est trop basse avant l'entraînement, il faut consommer des hydrates de carbone et attendre la normalisation de la glycémie.

#### Points importants à prendre en compte après l'activité physique :

- Mesurer la glycémie
- év. réduire la dose d'insuline
- év. prendre des repas supplémentaires (en particulier avant de dormir, consommer des « hydrates de carbone lents », p.ex. des produits laitiers)
- Soigner ses pieds
- Noter l'effort réalisé par écrit (éventuellement également les effets sur la glycémie)

## situations particulières

### diabète et conduite, maladie



#### Diabète et conduite

Les personnes atteintes de diabète présentent souvent un certain risque d'hypoglycémie. Les précautions suivantes doivent donc être prises au moment de se mettre au volant :

- Au début d'un traitement, il convient de consulter le médecin pour déterminer s'il faut éventuellement renoncer à la conduite d'un véhicule pendant quelques jours jusqu'à ce que l'effet des médicaments puisse être évalué.
- Selon le médicament, il faut mesurer et documenter la glycémie, en particulier avant les longs trajets.
- Lors de glycémies basses, mangez quelque chose avant le départ
- Lorsqu'il existe un risque – même minime – d'hypoglycémie, arrêtez-vous, prenez des hydrates de carbone rapides p. ex. des morceaux de sucre, du sucre de raisin, du jus d'orange ou du Coca-Cola (jamais de boissons light !) et attendez un peu, puis mesurez votre glycémie
- Ayez toujours sur vous des quantités suffisantes d'hydrates de carbone rapides et d'hydrates de carbone lents (p. ex. biscuits, pain, barres de céréales, raisins secs, fruits secs) ; n'oubliez pas que vous pourriez être bloqué durant des heures dans un bouchon
- Lors de longs trajets, planifiez des pauses
- Emporter avec soi en voiture suffisamment de médicaments et de bandelettes-test
- Prenez avec vous le certificat de diabétique
- Faites régulièrement des contrôles de la vue

#### Diabète et maladie

Lors d'une affection, p. ex. d'une infection fébrile, l'organisme libère des hormones qui provoquent une hausse de la glycémie. C'est pourquoi il est important, lors d'une maladie, d'injecter de l'insuline malgré un manque d'appétit. Il est possible que le besoin d'insuline augmente de 10% à 50%. C'est pourquoi les mesures de précaution ci-après sont recommandées :

- Mesurez la glycémie plus souvent que d'habitude
- Dans la mesure du possible, ne modifiez pas votre alimentation habituelle
- Lors de perte d'appétit, consommez régulièrement des hydrates de carbone facilement digestibles (p. ex. soupe d'avoine, bouillon (pauvre en graisses), jus de fruits, purée de fruits, pudding, etc.)
- Même lorsque vous ne mangez rien : l'insuline ne doit en aucun cas être complètement omise
- Notez :
  - l'heure à laquelle vous vous êtes fait une injection d'insuline et la quantité injectée
  - les glycémies et les heures de mesure
  - les repas, en précisant la quantité et l'heure
- Informez votre médecin et faites traiter votre maladie
- Consommez au moins 2 l de liquide par jour



**La fièvre et les infections**

Lors de maladies (fiévreuses), votre besoin d'insuline peut augmenter. Des contrôles réguliers de la glycémie permettent une adaptation rapide de la dose d'insuline, ce qui permet de prévenir une éventuelle hyperglycémie. Pour compenser la perte de liquide, buvez beaucoup. Lors d'une diminution de l'appétit, vous pouvez prendre une partie des hydrates de carbone sous la forme de jus de fruits.

**Vomissements et diarrhée**

Les vomissements et les diarrhées peuvent provoquer des hypoglycémies en raison de la diminution de la quantité de nourriture absorbée.

Conseil:

prenez des petites gorgées du cocktail glacé suivant :

1/3 thé noir

1/3 jus d'orange

1/3 bouillon ou solution salée

Des produits pouvant aider lors de vomissements sont les boissons au cola (pas de cola light) et les flûtes au sel. La dose d'insuline devra éventuellement être adaptée passagèrement. N'hésitez pas à appeler le médecin!

**Les diabétiques à l'hôpital**

Certaines situations imposent un séjour hospitalier. Avant l'hospitalisation, il est important de planifier le séjour et de discuter avec le médecin d'éventuelles modifications nécessaires du traitement du diabète. Emportez vous-même votre insuline lors d'une intervention chirurgicale planifiée.

**Diabète et travail**

Pour tout un chacun, il est important d'avoir une activité professionnelle satisfaisante, qui corresponde à ses intérêts, à ses capacités et à sa formation. Le choix professionnel n'est que peu limité pour les diabétiques. Le traitement avec des médicaments hypoglycémisants expose à un risque d'hypoglycémie apparaissant soudainement, c'est pourquoi certains métiers peuvent être inappropriés.

**Vie professionnelle et diabète**

L'employeur et les collègues de travail devraient être informés de votre maladie afin de pouvoir vous venir en aide en cas d'hypoglycémie.

**Diabète et voyage**

Les personnes diabétiques peuvent voyager comme tout le monde. Une planification soignée est toutefois importante. Les voyages entraînent généralement une modification de la routine quotidienne. Les modifications du régime et des activités physiques habituelles peuvent influencer la glycémie.

Dans certaines situations, il peut être judicieux de consulter son médecin avant le départ, afin de traiter d'éventuels problèmes de santé et de discuter de besoins susceptibles d'apparaître durant le voyage.

Le médecin peut également procéder aux vaccinations nécessaires et prescrire suffisamment de médicaments pour d'éventuelles urgences (p. ex. de l'insuline, du glucagon, des médicaments contre la diarrhée).

Lors de voyages en avion entraînant un décalage horaire important, il convient de discuter avec le médecin des doses nécessaires, des modifications de traitement et de la prise des repas.



Durant les vacances, il est recommandé de procéder à des mesures plus fréquentes de la glycémie et d'adapter la dose en conséquence si nécessaire. Ces mesures permettent de maintenir un bon contrôle de la glycémie durant les vacances.

**Check-list pour les voyages**

Prenez des réserves suffisantes de médicaments et de matériel de contrôle :

- Vos médicaments
- Aiguilles
- Lecteur de glycémie avec bandelettes-test, lancettes
- Bandelettes-test pour détecter les cétones dans les urines
- Le journal du diabète
- Carnet de diabétique
- Sucre en morceaux/ sucre de raisin
- Glucagon

Les bagages à main sont le meilleur endroit pour transporter les médicaments. Dans le compartiment à bagages des avions, il pourrait y avoir des températures très basses. Les insulines, comme aussi d'autres médicaments, ne doivent pas geler! Il est judicieux de répartir les réserves dans plusieurs bagages.

**Renseignez-vous sur les réglementations actuelles relatives aux voyages****Conseil :**

Demandez (de préférence au laboratoire pharmaceutique) si les médicaments sont disponibles dans le pays de destination. Il est recommandé d'emporter l'ordonnance du médecin, éventuellement en anglais.

**Les provisions de voyage**

Prenez suffisamment de provisions de voyage, afin de pouvoir couvrir d'éventuels retards et temps d'attente inattendus. Des pains suédois, des biscuits ou des fruits secs par exemple conviennent bien.

**Diabète et vie sexuelle**

La vie sexuelle a autant d'importance dans la vie des diabétiques que dans celle des non-diabétiques. Certains points doivent être pris en considération :

- Infections plus fréquentes
- Impuissance due au diabète

**Infections**

Les femmes diabétiques souffrent plus fréquemment d'infections dans la région génitale. Un bon contrôle de la glycémie et une hygiène soignée de la région génitale sont des facteurs importants pour prévenir ce problème. Les troubles de la région génitale doivent être traités par le médecin.

**Impuissance**

Des lésions vasculaires ou nerveuses peuvent provoquer des troubles de l'érection dus au diabète. Le médecin proposera des solutions adaptées au problème en question.

Les diabétiques présentant un bon contrôle de la glycémie, qui ne fument pas et qui ne boivent que peu d'alcool souffrent plus rarement de troubles de l'érection.

## situations particulières

### grossesse, allaitement

#### Diabète et grossesse

En tant que diabétique, vous pouvez comme les autres femmes vivre une grossesse sans problèmes et donner naissance à des enfants sains. Toutefois, pour éviter des complications, certaines mesures de précaution doivent être prises. Plus le métabolisme s'éloigne des valeurs normales, plus le risque pour l'enfant est important. Etant donné que dans le ventre de la mère, le glucose passe à travers le placenta (responsable des échanges de substances entre la mère et l'enfant à naître), la mère et l'enfant présentent la même glycémie. Des glycémies élevées peuvent avoir des effets négatifs sur le développement de l'enfant dans le ventre maternel. Il est important de déjà veiller à un réglage optimal de la glycémie préalablement à la grossesse.


En tant que femme enceinte diabétique, vous devez pouvoir bénéficier d'un suivi médical attentionné par le diabétologue et le gynécologue.

#### L'allaitement

Les femmes diabétiques peuvent allaiter leur enfant sans problème, car le diabète n'influence pas la capacité à allaiter. La mère diabétique doit juste veiller à compenser les variations de la glycémie et à boire au moins 3 litres de liquide par jour.

#### Diabète et tension psychique

Tout le monde est parfois soumis à une tension psychique. En tant que diabétique, veillez aux effets que de telles tensions (problèmes, déceptions, peur avant un examen, etc.) pourraient avoir sur votre glycémie. Lorsque nous sommes soumis à une tension psychique, l'organisme libère des « hormones du stress », comme l'adrénaline et la cortisone. Ces hormones veillent à ce que du sucre soit libéré dans le sang à partir des réserves hépatiques. Elles provoquent également une libération d'acides gras à partir des cellules adipeuses. Aussi bien le sucre que les acides gras peuvent être utilisés par l'organisme comme combustible. Les personnes non diabétiques produisent ensuite automatiquement plus d'insuline, afin de permettre l'absorption du sucre par les cellules. Les besoins accrus de combustible sont ainsi couverts en période de stress. L'équilibre entre le taux d'insuline et la glycémie est maintenu. Chez le diabétique, la sécrétion automatique d'insuline fait toutefois défaut et le stress psychique provoque une hausse de la glycémie.



## la fabrication et le stockage de l'insuline

#### Les insulines animales

Jusqu'en 1980, toutes les préparations d'insuline obtenues de manière industrielle étaient produites à partir de pancréas bovins et porcins. L'extraction d'insuline à partir de pancréas animaux était un procédé compliqué. Près de six mois étaient nécessaires pour produire un flacon d'insuline de cette façon. La quantité totale d'insuline obtenue était minuscule. En outre, les premières insulines animales contenaient une certaine quantité d'impuretés, provenant de l'animal d'origine et du procédé d'extraction. Les impuretés provoquent des intolérances et des réactions allergiques. Ce n'est que depuis 1973 qu'il a été possible de fabriquer des insulines animales de qualité purifiée (Monocomponent ; MC). Même si les réactions d'hypersensibilité vis-à-vis de l'insuline avaient ainsi pratiquement disparu, l'objectif restait la mise sur le marché d'insuline humaine, identique à celle produite par l'organisme.

#### Les insulines humaines

En 1980, Novo a mis au point un procédé commercial pour la production d'insuline humaine par la transformation dite semi-synthétique d'insuline porcine. L'insuline porcine obtenue à partir du pancréas de porc a été modifiée par une réaction chimique de sorte à ce que le produit final – l'insuline monocomposée humaine – soit identique à l'hormone naturelle humaine.

#### La production d'insuline par génie génétique

De nos jours, l'insuline est fabriquée par génie génétique. Lors du procédé de fabrication biotechnologique mis au point par Novo Nordisk, les cellules de levure sont « programmées » pour produire des protéines dont la structure est identique à celle de l'insuline humaine. Une fois que les levures « savent » ce qu'elles doivent produire, elles sont placées dans de grandes cuves contenant un milieu nutritif. Les levures libèrent l'insuline produite dans le milieu nutritif. L'insuline doit ensuite être extraite du milieu nutritif. Sa pureté est très élevée dès les pre-

mières étapes, et sa structure est identique à celle de l'insuline humaine endogène.

#### Les insulines modernes (analogues de l'insuline humaine)

La recherche se consacre depuis des années au développement de nouvelles préparations d'insuline qui présentent un profil d'action plus physiologique et qui permettent par conséquent un meilleur contrôle de la glycémie. Cette recherche a permis de mettre au point les analogues de l'insuline humaine. Dans ces insulines, une partie de la structure protéique a été modifiée de façon à exercer un effet plus physiologique. Il existe ainsi des analogues de l'insuline à courte et à longue durée d'action, qui sont très semblables à l'insuline humaine, mais qui présentent comme avantage de mieux imiter la glycémie des personnes non diabétiques.

## antidiabétique

### stockage des médicaments

#### Stockage des médicaments

Les médicaments ne doivent être utilisés que jusqu'à la date indiquée sur l'emballage par la mention « EXP ». Les médicaments peuvent être conservés au réfrigérateur (2 - 8 °C). Ils ne doivent pas être conservés trop près des éléments de réfrigération ou du compartiment congélateur et ne doivent pas être congelés.

Des médicaments en cours d'utilisation ou emportés avec soi en remplacement peuvent être conservés un certain temps à température ambiante. Des informations précises figurent sur l'emballage extérieur et sur la notice.



Yasmin Fiedler Type1 Allemagne

## glossaire

### définition de termes médicaux relatifs au diabète

#### Acidocétose

Hyperacidité du sang. Une carence en insuline provoque une dégradation accrue des graisses, ce qui entraîne la formation de corps cétoniques acides qui acidifient excessivement le sang. Si elle n'est pas traitée, elle peut être mortelle.

#### Analogues de l'insuline

Insulines dont les propriétés pharmacologiques ont été améliorées en raison d'une modification de leur structure, c'est-à-dire qu'elles agissent plus rapidement ou plus longtemps que l'insuline humaine.

#### Antidiabétiques oraux (ADO)

Médicaments sous forme de comprimés qui baissent le taux de sucre dans le sang. Ils ne peuvent être envisagés que pour le traitement du diabète de type 2.

#### Cellules bêta

Un type de cellules dans le pancréas, responsables de la production d'insuline.

#### Créatinine

Substance formée dans les muscles et excrétée par les reins. La quantité de créatinine dans le sang peut donc être utilisée comme marqueur de la performance des reins.

#### Diabète de type 1

Le diabète de type 1 apparaît suite à un déficit de l'hormone insuline. Les cellules productrices d'insuline dans le pancréas sont détruites par le système immunitaire de l'organisme. Il s'agit là du diabète classique par déficit de l'insuline, qui débute généralement (mais pas seulement) chez l'enfant et l'adolescent.

#### Diabète de type 2

Le diabète de type 2 apparaît d'une part suite à une diminution de la sensibilité des cellules corporelles à l'insuline (résistance à l'insuline). D'autre part, une surproduction durant des années de l'insuline entraîne un «épuisement» des cellules produisant de l'insuline. Le diabète de type 2 est également appelé «diabète de l'âge», car il n'apparaît généralement que dès l'âge adulte. Toutefois, les cas de diabète de type 2 chez les adolescents en fort surpoids sont désormais de plus en plus fréquents.

#### Diabète gestationnel

Ce diabète apparaît durant la grossesse et disparaît généralement après la naissance de l'enfant.

Chez certaines femmes, le déséquilibre métabolique peut cependant persister après l'accouchement, ou un diabète de type 2 peut se développer au bout de 5 à 10 ans.

#### Diabète sucré

Maladie métabolique qui entraîne des glycémies élevées. Il existe principalement deux formes de diabète: le diabète de type 1 et le diabète de type 2.

#### Dyslipidémie

Trouble du métabolisme des graisses dans lequel il y a des écarts par rapport aux valeurs normales des lipides sanguins. Cela peut signifier, par exemple, des valeurs trop élevées de cholestérol LDL et/ou de triglycérides, et/ou des valeurs trop faibles de cholestérol HDL.

#### GLP-1

Le GLP-1 est une hormone naturelle formée dans l'intestin et sécrétée dans le sang après la prise de nourriture. Le GLP-1 augmente, en fonction de la glycémie, la libération d'insuline par les cellules bêta du pancréas.

#### Glucagon

Hormone qui agit comme un antagoniste de l'insuline et qui est produite dans les cellules alpha du pancréas. Le glucagon est sécrété lorsque le taux de glycémie est trop bas et entraîne la dégradation du glycogène en glucose.

#### Glucose

Est souvent appelé également «sucre de raisin» et fait partie des hydrates de carbone. Il constitue la principale source d'énergie du corps et son taux est mesuré lors des tests de glycémie. L'absorption du glucose dans les cellules du corps est commandée par l'hormone insuline.

#### Glycémie

Elle décrit la concentration de sucre (glucose) dans le sang. Le taux de glycémie peut être mesuré. La glycémie à jeun normale est inférieure à 5,6 mmol/l. Après un repas riche en hydrates de carbone, la glycémie augmente et, grâce à l'effet de l'insuline, se normalise à nouveau.

#### Glycogène

Sucre complexe à longue chaîne, composé d'unités de glucose et servant à stocker l'énergie.

#### Glycosurie

Excrétion urinaire de glucose.

**HbA<sub>1c</sub>**

Hémoglobine glyquée ou «mémoire glycémique». Une fraction de l'hémoglobine des globules rouges est «sucrée» par la présence de glucose dans le sang. Le taux de HbA<sub>1c</sub> fournit des informations sur le réglage glycémique des derniers deux à trois mois. La valeur normale de l'HbA<sub>1c</sub> est inférieure à 5,7 %. L'objectif d'un traitement antidiabétique est généralement d'atteindre un taux d'HbA<sub>1c</sub> inférieur à 7,0%, mais cela dépend de la situation individuelle du patient.

**Hydrates de carbone**

Les hydrates de carbone (ou glucides) sont des éléments nutritifs qui fournissent de l'énergie. Ils sont présents dans les aliments sous forme d'amidon et de sucre, sont divisés dans le tube digestif en éléments individuels de sucre et absorbés dans le sang. Il existe des glucides à action rapide et des glucides à action lente.

**Hyperglycémie**

Taux élevé de sucre dans le sang. Les signes aigus sont entre autres une envie urgente d'uriner et une soif intense. Non traitée, elle peut être à l'origine de conséquences tardives du diabète et d'un coma diabétique.

**Hypoglycémie**

Faible taux sanguin de sucre. La valeur limite est individuelle, mais chez les diabétiques, on peut parler d'hypoglycémie le cas échéant déjà à partir de valeurs inférieures à 3,9 mmol/l. Les causes peuvent être une faible prise d'hydrates de carbone, un excès d'insuline ou un effort physique excessif. Des troubles comme une transpiration, des tremblements, des palpitations, de la faim, des troubles de la coordination, de la confusion peuvent apparaître. Une hypoglycémie non traitée peut entraîner une perte de connaissance.

**Incrétines**

Les incrétones sont des hormones de l'organisme qui se forment dans l'intestin et sont libérées dans le sang après la prise de nourriture. Cela stimule la libération d'insuline par le pancréas. Le GLP-1 est l'hormone incréteine la plus connue.

**Insuline basale**

Les insulines basales sont des insulines à action prolongée qui sont lentement libérées dans le sang et servent à couvrir les besoins de base de l'organisme. On les appelle aussi insulines pour vivre.

**Insuline mixte**

Mélange préfabriqué d'insuline à action rapide et d'insuline à action prolongée. Elle est administrée au moment d'un repas.

**Insuline prandiale**

Les insulines prandiales sont des insulines qui ont un début d'action rapide et une courte durée d'action. Elles sont administrées au moment des repas pour contrôler l'augmentation de la glycémie après la prise de nourriture. On les appelle aussi insulines pour manger ou bolus.

**Insuline**

L'insuline est une hormone qui baisse le taux de sucre dans le sang. Il s'agit d'une protéine produite dans les cellules bêta du pancréas. L'insuline permet au glucose sanguin de pénétrer dans les cellules par la membrane cellulaire.

**Maladie autoimmune**

Trouble dans lequel le système immunitaire est dirigé contre le corps. Dans le diabète de type 1 ce mécanisme pathologique détruit les cellules bêta du pancréas.

**Microalbuminurie**

Excrétion de petites quantités de protéines pouvant être mesurées dans l'urine et constituant un premier signe de néphropathie.

**mmol/l**

Millimoles par litre. Unité de mesure indiquant le nombre de particules de sucre par litre de sang. Le facteur de conversion de mmol/l en mg/dl est:  $18,016 \times \text{mmol/l} = \text{mg/dl}$ .

**Néphropathie diabétique**

Atteinte des reins, due au diabète. Pendant longtemps, la personne concernée ne présente aucun trouble, ce qui rend difficile la détection de la néphropathie à stade précoce. L'excrétion de protéines dans l'urine est le premier moyen de détecter une lésion rénale.

**Neuropathie diabétique**

Atteinte du système nerveux, due au diabète. Aussi bien le système nerveux sensorimoteur que le système nerveux autonome peuvent être affectés.

**Obésité**

Surpoids pathologique à partir d'un indice de masse corporelle (IMC) de 30 kg/m<sup>2</sup>.

**Pancréas**

Organe glandulaire qui produit, entre autres, des enzymes digestives et des hormones servant à la régulation de la glycémie. L'insuline est produite dans les cellules bêta du pancréas et libérée dans le sang.

**Pied diabétique**

Complication du diabète. En raison de troubles circulatoires et nerveux, les personnes touchées perdent des capacités sensorielles dans le pied et développent plus fréquemment des ulcères, qui peuvent devenir chroniques. La prévention consiste en un réglage optimal de la glycémie et des soins réguliers des pieds.

**Résistance à l'insuline**

Une anomalie du métabolisme, souvent à l'origine du diabète de type 2: les cellules de l'organisme réagissent trop peu à l'insuline. Le surpoids est un facteur de risque majeur de résistance à l'insuline.

**Rétinopathie diabétique**

La rétinopathie diabétique est une maladie de la rétine qui est provoquée par un taux de glycémie trop élevé. Il peut s'ensuivre une détérioration de la vision pouvant aller jusqu'à la cécité. La prévention consiste en un réglage optimal de la glycémie.

**Schéma basal-bolus**

Insulinothérapie qui imite la sécrétion naturelle d'insuline par l'organisme. Celle-ci se fait continuellement, en petites quantités (sécrétion basale) et augmente après les repas. Afin d'imiter ce principe, une insuline à action rapide et une autre à action prolongée sont nécessaires. L'insuline à action prolongée est injectée une à deux fois par jour («traitement basal»). Les besoins particulièrement élevés d'insuline au moment des repas sont couverts avec l'insuline à action rapide («bolus»). Plusieurs mesures quotidiennes de la glycémie sont nécessaires.

**Syndrome métabolique**

Le syndrome métabolique est une association d'excès pondéral, d'hypertension et de taux de cholestérol et de glycémie élevés. Cette association représente un facteur de risque significatif pour les maladies cardiovasculaires ou pour un diabète.



Alex Silverberg Type1 Suède

## world diabetes day 14 novembre

### Journée mondiale du diabète\*

La Journée mondiale du diabète est un événement organisé depuis 1991 par la Fédération internationale du diabète (FID) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Depuis 2007, la Journée mondiale du diabète est une journée officielle des Nations Unies (ONU). Elle a été adoptée en décembre 2006 dans la résolution 61/225. Avec la Journée mondiale de lutte contre le sida, proclamée en 1988, elle est ainsi la deuxième journée qui est consacrée à une maladie. On a choisi le 14 novembre, date de naissance de Frederick G. Banting, qui a découvert en 1921, conjointement avec Charles Herbert Best, cette hormone vitale qu'est l'insuline.



## world diabetes day

### Le logo

Pour donner un visage à la Journée mondiale du diabète et au projet « Unite for Diabetes », il a été décidé de choisir un cercle bleu comme signe d'unité dans la lutte contre le diabète sucré.

Le cercle symbolise depuis toujours la vie et la santé, la couleur bleue unit les pays sous le ciel et est également la couleur officielle des Nations Unies.

\*[www.worlddiabetesday.org](http://www.worlddiabetesday.org)



## WORLD DIABETES FOUNDATION

### World Diabetes Foundation

La santé publique dans les pays en voie de développement n'est souvent pas en mesure de satisfaire aux exigences posées par le nombre croissant de diabétiques. L'absence d'une véritable prise de conscience et d'instructions dont pourraient bénéficier les diabétiques constitue un problème important. Les experts sont tous d'accord qu'une lutte efficace contre le diabète doit comprendre des mesures d'information, d'instruction et de prévention, associées à l'accès à des possibilités de traitement. On estime, en se basant sur des extrapolations, que 50 à 80% des cas de diabète survenant dans des pays en voie de développement ne sont pas diagnostiqués.

A ce problème s'ajoutent une méconnaissance du diabète, les connaissances lacunaires des médecins et infirmières ainsi que le nombre insuffisant d'hôpitaux et le manque d'infrastructures permettant le traitement du diabète. C'est pourquoi Novo Nordisk a fondé, en 2001, la World Diabetes Foundation. Cette fondation soutient divers projets consacrés à la lutte contre le diabète.

## épilogue

### références impressum

#### Epilogue

Il y a près de 100 ans, Novo Nordisk a été l'une des premières entreprises du monde à fabriquer de l'insuline. Cette époque marque le début de nos efforts visant à modifier, partout dans le monde, les méthodes thérapeutiques utilisées contre le diabète. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la prévention et le traitement du diabète, dans l'optique de son éradication. C'est pour cette raison que Novo Nordisk investit plusieurs centaines de millions dans la recherche sur cette maladie. Novo Nordisk modifie le diabète - en développant de nouvelles méthodes thérapeutiques. Nous avons conscience de ne pas simplement traiter le diabète, mais aussi de contribuer à améliorer la vie d'êtres humains. Toutes nos décisions et toutes nos actions se fondent sur cette philosophie.

#### Adresses utiles

- diabètesuisse  
Rütistrasse 3a, 5400 Baden,  
Tel. 056 200 17 90, [www.diabetesschweiz.ch/fr](http://www.diabetesschweiz.ch/fr)  
et les sociétés de diabète dans votre région



#### Impressum

9e édition remaniée 2020

Ce guide pour diabétiques a été préparé par la société Novo Nordisk Pharma SA, Zürich

Conception et réalisation:

Kommunikation & Gestaltung,  
Werner Morelli, Graphiste SGD, Photographe